

貯 法：2~8°Cで保存
有効期間：36箇月

—抗悪性腫瘍剤—
ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
ニボルマブ（遺伝子組換え）製剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

	承認番号	販売開始
20mg	22600AMX00768000	2014年9月
100mg	22600AMX00769000	
120mg	30200AMX00925000	2020年11月
240mg	23000AMX00812000	2018年11月

オプジー[®]点滴静注 20mg オプジー[®]点滴静注 100mg オプジー[®]点滴静注 120mg オプジー[®]点滴静注 240mg

OPDIVO[®] I.V. Infusion

最適使用推進ガイドライン対象品目

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

1. 警告

1. 1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
1. 2 間質性肺疾患があらわれ、死亡に至った症例も報告されているので、初期症状（息切れ、呼吸困難、咳嗽、疲労等）の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、9.1.2、11.1.1 参照]

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	オプジー [®] 点滴静注 20mg	オプジー [®] 点滴静注 100mg	オプジー [®] 点滴静注 120mg	オプジー [®] 点滴静注 240mg	
有効成分	ニボルマブ（遺伝子組換え） ^{注1)}				
含量/容量 ^{注2)} (1バイアル中)	20mg /2mL	100mg /10mL	120mg /12mL	240mg /24mL	
添加剤	D-マンニトール クエン酸ナトリウム 水和物 塩化ナトリウム ジエチレントリアミン五酢酸 ポリソルベート80 pH調節剤 2成分	60mg 11.76mg 5.84mg 0.01576mg 0.4mg 適量	300mg 58.8mg 29.2mg 0.0788mg 2mg 適量	360mg 70.6mg 35.0mg 0.0946mg 2.4mg 適量	720mg 141mg 70.1mg 0.189mg 4.8mg 適量

注1) 本剤は遺伝子組換え技術により、チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。

注2) 本品は注射液吸引時の損失を考慮して、過量充填されているので、実充填量は各々 22mg/2.2mL、105mg/10.5mL、126mg/12.6mL、246mg/24.6mL である。

3. 2 製剤の性状

販売名	オプジー [®] 点滴静注 20mg	オプジー [®] 点滴静注 100mg	オプジー [®] 点滴静注 120mg	オプジー [®] 点滴静注 240mg
剤形	注射剤（バイアル）			
pH	5.5~6.5			
浸透圧比	約1.2（生理食塩液対比）			
性状	無色~微黄色の澄明又は乳白光を呈する液。微粒子をわずかに認めることができる。			

4. 効能又は効果

- 悪性黒色腫
○切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
○根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
○再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
○再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
**○治癒切除不能な進行・再発の胃癌
○切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
○がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌
○がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌
**○食道癌における術後補助療法

5. 効能又は効果に関する注意

- 〈悪性黒色腫〉
5. 1 「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.1-17.1.7 参照]
〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉
5. 2 臨床試験に組み入れられた患者のEGFR遺伝子変異又はALK融合遺伝子の有無等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.9-17.1.11 参照]
5. 3 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉
5. 4 化学療法未治療患者に対してイビリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合、IMDC^{注3)}リスク分類がintermediate又はpoorリスクの患者を対象とすること。
5. 5 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 6 「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.12-17.1.14 参照]
〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
*5. 7 「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
[17.1.15-17.1.17 参照]

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉

5. 8 プラチナ製剤を含む化学療法による治療歴のない患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。
5. 9 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 10 「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.18 参照]

**〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

5. 11 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉

5. 12 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

〈がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性 (MSI-High) を有する結腸・直腸癌〉

5. 13 フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩水和物による治療歴のない患者における本剤の有効性及び安全性は確立していない。

5. 14 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MSI-High が確認された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：

<https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0001.html>

5. 15 「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこと。[17.1.24 参照]

5. 16 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

〈がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌〉

5. 17 本剤の一次治療における有効性及び安全性は確立していない。

5. 18 「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.25 参照]

**〈食道癌における術後補助療法〉

5. 19 術前補助療法により病理学的完全奏効 (pCR) が認められなかった患者に投与すること。

5. 20 本剤の術前補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

5. 21 臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴、pCR の定義等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。[17.1.26 参照]

注) International Metastatic RCC Database Consortium

6. 用法及び用量

〈悪性黒色腫〉

通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の場合は、投与期間は 12 カ月間までとする。

根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 80mg を 3 週間間隔で 4 回点滴静注する。その後、ニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。

**〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 360mg を 3 週間間隔で点滴静注する。

〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉

通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。

カボザンチニブと併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。

化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対してイピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 3 週間間隔で 4 回点滴静注する。その後、ニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。

*〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。

通常、小児にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 3mg/kg（体重）を 2 週間間隔で点滴静注する。なお、体重 40kg 以上の中児には、ニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注することもできる。

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉

通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。

〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉

通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。

イピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 360mg を 3 週間間隔で点滴静注する。

〈がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性 (MSI-High) を有する結腸・直腸癌〉

通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。

イピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 3 週間間隔で 4 回点滴静注する。その後、ニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。

**〈がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌における術後補助療法〉

通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1 回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。ただし、食道癌における術後補助療法の場合は、投与期間は 12 カ月間までとする。

7. 用法及び用量に関する注意

〈効能共通〉

7. 1 本剤は、30 分以上かけて点滴静注すること。

〈悪性黒色腫〉

7. 2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性について慎重に判断すること。また、イピリムマブ（遺伝子組換え）の上乗せによる延命効果は、PD-L1 を発現した腫瘍細胞が占める割合 (PD-L1 発現率) により異なる傾向が示唆されている。イピリムマブ（遺伝子組換え）との併用投与に際して PD-L1 発現率の測定結果が得られ、PD-L1 発現率が高いことが確認された患者においては、本剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。[17.1.6 参照]

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

7. 3 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

7. 4 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験において検討された患者の PD-L1 発現率を考慮した上で選択すること。[17.1.10 参照]

〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉

7. 5 化学療法未治療患者及びサイトカイン製剤のみの治療歴を有する患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

7. 6 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉

7. 7 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

**〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

7. 8 本剤単独投与の一次治療及び二次治療における有効性及び安全性は確立していない。
7. 9 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合には、HER2陰性の患者に投与すること。
7. 10 他の抗悪性腫瘍剤との併用投与の有効性は、PD-L1発現率(CPS)により異なる傾向が示唆されている。CPSについて、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤を併用する必要性について慎重に判断すること。[17.1.20 参照]

7. 11 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し選択すること。[17.1.20, 17.1.21 参照]

〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉

7. 12 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

〈がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌〉

7. 13 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

**〈食道癌における術後補助療法〉

7. 14 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

8. 1 本剤のT細胞活性化作用により、過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な疾患や病態があらわれることがある。観察を十分に行い、異常が認められた場合には、過度の免疫反応による副作用の発現を考慮し、適切な鑑別診断を行うこと。過度の免疫反応による副作用が疑われる場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等を考慮すること。また、本剤投与終了後に重篤な副作用があらわれることがあるので、本剤投与終了後も観察を十分に行うこと。

8. 2 間質性肺疾患があらわれることがあるので、本剤の投与にあたっては、臨床症状(呼吸困難、咳嗽、発熱、肺音の異常(捻髪音)等)の確認及び胸部X線検査の実施等、観察を十分に行うこと。また、必要に応じて胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。[1.2, 9.1.2, 11.1.1 参照]

8. 3 重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症があらわれることがあるので、筋力低下、眼瞼下垂、呼吸困難、嚥下障害、CK上昇、心電図異常、血中及び尿中ミオグロビン上昇等の観察を十分に行うこと。[11.1.2 参照]

8. 4 1型糖尿病があらわれることがあるので、口渴、恶心、嘔吐等の症状の発現や血糖値の上昇に十分注意すること。[11.1.4 参照]

8. 5 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.6 参照]

8. 6 甲状腺機能障害、下垂体機能障害及び副腎障害があらわれることがあるので、本剤の投与開始前及び投与期間中は定期的に内分泌機能検査(TSH、遊離T3、遊離T4、ACTH、血中コルチゾール等の測定)を実施すること。また、必要に応じて画像検査等の実施も考慮すること。[11.1.7, 11.1.8, 11.1.11 参照]

8. 7 腎障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.10 参照]

8. 8 Infusion reactionがあらわれることがあるので、本剤の投与は重度のInfusion reactionに備えて緊急時に十分な対応ができる準備を行った上で開始すること。また、2回目以降の本剤投与時にInfusion reactionがあらわれることもあるので、本剤投与中及び本剤投与終了後はバイタルサインを測定するなど、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.15 参照]

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

8. 9 本剤とカルボプラチニン、パクリタキセル及びベバシズマブ(遺伝子組換え)を併用投与する際には、発熱性好中球減少症があらわれることがあるので、必要に応じて血液検査を行う等、患者の状態を十分に観察すること。[11.1.5 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9. 1 合併症・既往歴等のある患者

9. 1. 1 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のある患者

自己免疫疾患が増悪するおそれがある。

9. 1. 2 間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者

間質性肺疾患が増悪するおそれがある。[1.2, 8.2, 11.1.1 参照]

9. 1. 3 臓器移植歴(造血幹細胞移植歴を含む)のある患者

本剤の投与により移植臓器に対する拒絶反応又は移植片対宿主病が発現するおそれがある。

9. 1. 4 結核の感染又は既往を有する患者

結核を発症するおそれがある。[11.1.17 参照]

9. 4 生殖能を有する者

妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊法を用いるよう指導すること。[9.5 参照]

9. 5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。妊娠サルを用いた出生前及び出生後の発生に関する試験において、10mg/kgの週2回投与(AUC比較で臨床曝露量の約6倍に相当する)により妊娠末期における胚・胎児死亡率あるいは出生児死亡率の増加が認められたが、催奇形性は認められなかった。また、出生児の成長及び発達に影響は認められなかった。なお、本剤は出生児の血清中で認められている。[9.4 参照]

9. 6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。本剤のヒト乳汁中への移行は検討されていないが、ヒトIgGは乳汁中に移行するので、本剤も移行する可能性がある。

9. 7 小児等

〈悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌、切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫、がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌、がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌における術後補助療法〉

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

低出生体重児、新生児又は乳児を対象とした臨床試験は実施していない。

9. 8 高齢者

患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10. 2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
生ワクチン	接種したワクチンに対する過度な免疫応答に基づく症状が発現した場合には適切な処置を行うこと。	本剤のT細胞活性化作用による過度の免疫反応が起こるおそれがある。
弱毒生ワクチン		
不活化ワクチン		

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと¹⁾。

11. 1 重大な副作用

**11. 1. 1 間質性肺疾患

肺臓炎、肺浸潤、肺障害等の間質性肺疾患(3.4%、6.1%)があらわれることがあるので、異常が認められた場合には、速やかに胸部X線、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。[1.2, 8.2, 9.1.2 参照]

**11. 1. 2 重症筋無力症(0.1%未満、0.1%未満)、心筋炎(0.1%未満、0.2%)、筋炎(0.1%未満、0.3%)、横紋筋融解症(頻度不明、0.1%未満)

これらを合併したと考えられる症例も報告されている。また、重症筋無力症によるクリーゼのため急速に呼吸不全が進行があるので、呼吸状態の悪化に十分注意すること。[8.3 参照]

**11. 1. 3 大腸炎(1.1%、3.4%)、小腸炎(0.1%未満、0.2%)、重度の下痢(0.8%、4.0%)

腸炎から穿孔、イレウスに至る例が報告されている。持続する下痢、腹痛、血便等の症状があらわれた場合には、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

11. 1. 4 1型糖尿病

1型糖尿病（劇症1型糖尿病を含む）（0.2%、0.4%）があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシスに至ることがある。1型糖尿病が疑われた場合には投与を中止し、インスリン製剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.4参照]

**11. 1. 5 重篤な血液障害

免疫性血小板減少性紫斑病（頻度不明、0.1%未満）、溶血性貧血（頻度不明、0.1%未満）、無顆粒球症（頻度不明、頻度不明）、発熱性好中球減少症（0.1%未満、2.0%）等の重篤な血液障害があらわれることがある。また、本剤とカルボプラチナ、パクリタキセル及びベバシズマブ（遺伝子組換え）との併用において、発熱性好中球減少症（15.8%^{注1)}）があらわれることがある。[8.9参照]

注1) 発現頻度はONO-4538-52試験から集計した。

**11. 1. 6 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎

劇症肝炎（頻度不明、頻度不明）、肝不全（頻度不明、0.1%未満）、AST増加、ALT増加、γ-GTP増加、Al-P増加、ビリルビン増加等を伴う肝機能障害（0.7%、4.4%）、肝炎（0.3%、1.7%）、硬化性胆管炎（頻度不明、頻度不明）があらわれることがある。[8.5参照]

**11. 1. 7 甲状腺機能障害

甲状腺機能低下症（7.2%、13.3%）、甲状腺機能亢進症（3.2%、6.7%）、甲状腺炎（0.9%、1.4%）等の甲状腺機能障害があらわれることがある。[8.6参照]

**11. 1. 8 下垂体機能障害

下垂体炎（0.4%、2.1%）、下垂体機能低下症（0.2%、0.8%）、副腎皮質刺激ホルモン欠損症（0.1%未満、0.1%）等の下垂体機能障害があらわれることがある。[8.6参照]

**11. 1. 9 神経障害

末梢性ニューロパシー（1.2%、20.6%）、多発ニューロパシー（0.1%未満、0.4%）、自己免疫性ニューロパシー（0.1%未満、頻度不明）、ギラン・バレー症候群（0.1%未満、0.1%未満）、脱髓（0.1%未満、頻度不明）等の神経障害があらわれることがある。

**11. 1. 10 腎障害

腎不全（0.5%、1.6%）、尿細管間質性腎炎（0.1%、0.1%）、糸球体腎炎（頻度不明、0.1%未満）等の腎障害があらわれることがある。[8.7参照]

**11. 1. 11 副腎障害

副腎機能不全（0.6%、3.0%）等の副腎障害があらわれることがある。[8.6参照]

**11. 1. 12 脳炎（0.1%未満、0.2%）

**11. 1. 13 重度の皮膚障害

中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis: TEN）（頻度不明、0.1%未満）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（0.1%未満、0.1%未満）、類天疱瘡（0.1%未満、0.1%未満）、多形紅斑（0.1%、0.3%）等の重度の皮膚障害があらわれることがある。

11. 1. 14 静脈血栓塞栓症

深部静脈血栓症（0.1%未満、0.4%）、肺塞栓症（0.1%未満、0.4%）等の静脈血栓塞栓症があらわれることがある。

**11. 1. 15 Infusion reaction

アナフィラキシー、発熱、悪寒、そう痒症、発疹、高血圧、低血圧、呼吸困難、過敏症等を含むInfusion reaction（3.1%、7.8%）があらわれることがある。重度のInfusion reactionがあらわれた場合には直ちに投与を中止して適切な処置を行うとともに、全ての徴候及び症状が完全に回復するまで患者の状態を十分に観察すること。[8.8参照]

11. 1. 16 血球貪食症候群（頻度不明、頻度不明）

11. 1. 17 結核（頻度不明、頻度不明）[9.1.4参照]

**11. 1. 18 膜炎（0.3%、0.7%）

注1)「重大な副作用」の発現頻度は、単独投与時、併用投与時の順に記載した。

11. 2 その他の副作用

11. 2. 1 単独投与

	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明
血液及び リンパ系 障害		貧血、リン パ球減少 症、白血球 減少症、血 小板減少 症、好中球 減少症	リンパ節症、赤血球数減少、ヘマト クリット減少、白血球增加症、好中 球数增加、単球数增加、好酸球 增加症、ヘモグロビン減少	単球数 減少、 好酸球 数減少
心臓障害			徐脈、心房細動、心室性期外収 縮、頻脈、動悸、伝導障害、不整 脈、心電図QT延長	心肥大、 心不全、 急性心 不全
耳及び 迷路障害			回転性めまい、耳不快感、難聴	
内分泌 障害	リバーゼ増 加		尿中ドウ糖陽性、抗甲状腺抗体陽 性	
眼障害			眼乾燥、ぶどう膜炎、硝子体浮遊 物、流涙增加、霧視、視力障害、 複視、角膜障害	フォーク ト・小柳・ 原田症 候群
胃腸障害	下痢、 恶心	腹痛、口内 乾燥、口内 炎、嘔吐、 便秘	消化不良、腹部不快感、腹部膨 満、腹水、胃潰瘍、胃炎、十二指 腸潰瘍、口の感覺鈍麻、口唇炎、 胃食道逆流性疾患、放屁、口腔障 害、歯肉出血、嚥下障害、流涎過 多、胃腸障害、口腔知覚不全、消 化管出血	
全身障害	疲労 (20.3%)、無 力症	倦怠感、悪 寒、浮腫、 粘膜の炎 症、発熱、 インフルエン ザ様疾患	口渴、顔面浮腫、注射部位反応、 腫脹、胸部不快感、全身健康状 態低下、疼痛、胸痛	
免疫系 障害			リウマチ因子增加、抗核抗体增加、 補体因子增加、抗リン脂質抗体陽 性、サルコイドーシス	リウマチ 因子陽 性、イン ターロイ キン濃 度增加
感染症			癰、気管支炎、気道感染、蜂巣炎、 爪感染、外耳炎、中耳炎、歯周炎、 歯肉炎、鼻咽頭炎、膿疱性皮疹、 帶状疱疹、尿路感染、肺感染	
代謝及び 栄養障害	食欲 減退	高血糖、低 ナトリウム血 症、高アミ ラーゼ血症	糖尿病、脱水、高尿酸血症、高カリ ウム血症、低カリウム血症、高カルシウ ム血症、低カルシウム血症、高ナトリウ ム血症、低マグネシウム血症、低リニ 酸血症、低アルブミン血症、高コレス テロール血症、高トリグリセリド血症、 脂質異常症、血中リン增加、低ク ロール血症、高マグネシウム血症	代謝性 アシドー シス、総 蛋白減 少
筋骨格系 及び結合 組織障害	関節 痛	筋肉痛	四肢痛、背部痛、筋固縮、筋力低 下、側腹部痛、筋骨格硬直、リウマ チ性多発筋痛、関節炎、筋骨格痛、 関節腫脹、開口障害、筋痙攣、 シェーグレン症候群、頸部痛、腱炎、 関節硬直	
精神・神 経系障害		味覚異常、 浮動性めま い、頭痛	不眠症、傾眠、記憶障害、感覺鈍 麻、不安、感情障害、リビドー減退、 うつ病、錯覚	
腎及び 尿路障害		血中クレア チニン增加	頻尿、蛋白尿、血尿、血中尿素增 加、尿沈渣異常、膀胱炎	
呼吸器、 胸郭及び 綻隔障害		呼吸困難、 咳嗽	口腔咽頭痛、肺出血、胸水、しゃべ り、喉頭痛、鼻出血、アレルギー性鼻 炎、喘鳴、鼻漏、鼻閉、喀血、サー ファクタントプロテイン增加、低酸素症、 気道の炎症、喉頭浮腫、発声障害	

	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明		5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明	
**	皮膚及び皮下組織障害	そう痒症、発疹	皮膚乾燥、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、丘疹性皮疹、湿疹、尋常性白斑、脱毛症	尋麻疹、中毒性皮疹、乾癬、紫斑、多汗症、寝汗、苔癬様角化症、爪の障害、手足症候群、皮膚色素過剩、毛髪変色、皮膚色素減少、皮膚腫瘍、皮膚炎、皮膚病変、白斑、酒さ		代謝及び栄養障害	食欲減退(20.4%)、高リバーゼ血症、高アミラーゼ血症	高血糖、低ナトリウム血症、脱水、低カリウム血症、低アルブミン血症、低マグネシウム血症、低リン酸血症、低カルシウム血症	糖尿病、高カルシウム血症、高コレステロール血症、高ナトリウム血症、高トリグリセリド血症、高尿酸血症、脂質異常症、低クロール血症、代謝性アシーリン、高カリウム血症、総蛋白減少	高マグネシウム血症、血中リン増加
**	血管障害			潮紅、ほてり、高血圧、低血圧、血管炎						
その他		体重減少		硬膜下血腫、真珠腫、気管出血、乳頭痛、細胞マーカー増加、血中CK減少、血中LDH増加、CRP増加、体重増加、血中CK増加、組織球性壞死性リンパ節炎		筋骨格系及び結合組織障害	関節炎、背部痛、四肢痛、筋痙攣、筋力低下	筋骨格痛、筋骨格硬直、関節腫脹、頸部痛、脊椎関節障害、側腹部痛、筋肉固縮、関節硬直、リウマチ性多発筋痛、腱炎、頸骨壊死、開口障害	シェーグレン症候群	

11.2.2 併用投与

	5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明		5%以上	1~5%未満	1%未満	頻度不明	
**	血液及びリンパ系障害	好中球減少症(20.2%)、血小板減少症(15.7%)、貧血、白血球減少症	リンパ球減少症	リンパ節症、白血球増加症、好酸球増加症、ヘマトクリット減少、単球増加症、好酸球減少症、好中球増加症、ヘモグロビン減少、赤血球減少症	単球数減少	精神・神経系障害	味覚異常	浮動性めまい、錯感覚、不眠症、頭痛、感覺鈍麻	失神、不安、うつ病、傾眠、嗜眠、記憶障害、感情障害、リビドー減退、神経炎、錯乱状態、腓骨神経麻痺	
	心臓障害			頻脈、不整脈、心不全、心房細動、徐脈、動悸、心電図QT延長	心肥大、急性心不全、心室性期外収縮、伝導障害	腎及び尿路障害	血中クレアチニン増加、蛋白尿	頻尿、血尿、血中尿素增加、膀胱炎	尿沈渣異常	
**	耳及び迷路障害			回転性めまい、難聴、耳鳴	耳不快感	呼吸器、胸郭及び縦隔障害		咳嗽、呼吸困難、しゃっくり、鼻出血、发声障害	肺出血、気道の炎症、胸水、喉頭痛、アレルギー性鼻炎、喘鳴、鼻漏、鼻閉、喀血、低酸素症、サーファクタントプロテイン増加、口腔咽頭痛	喉頭浮腫
	内分泌障害			性腺機能低下、副甲状腺機能低下症	尿中ブドウ糖陽性、抗甲状腺抗体陽性	皮膚及び皮下組織障害	発疹(18.9%)、そう痒症(18.1%)、丘疹性皮疹、脱毛症、手足症候群	皮膚炎、皮膚病変、紅斑、皮膚色素減少、毛髪変色、苔癬様角化症、爪の障害、皮膚腫瘍、紫斑、湿疹、寝汗、多汗症、尋常性白斑	白斑、中毒性皮疹、乾癬、皮膚色素減少、毛髪変色、苔癬様角化症、爪の障害、皮膚腫瘍、紫斑、湿疹、寝汗、多汗症、尋常性白斑	酒さ
**	眼障害		眼乾燥、涙液増加	霧視、ぶどう膜炎、視力障害、硝子体浮遊物、複視、角膜障害、上強膜炎	フォート・小柳・原田症候群	**				
**	胃腸障害	下痢(28.7%)、悪心(26.6%)、嘔吐、便秘、口内炎、腹痛	消化不良、口内乾燥	腹部膨満、腹部不快感、胃炎、放屁、胃腸障害、口腔知覚不全、口腔障害、腹水、腸管穿孔、口唇炎、嚥下障害、十二指腸炎、十二指腸潰瘍、消化管出血、歯肉出血、口腔内痛、舌痛、痔核、胃食道逆流性疾患、流涎過多、口の感覺鈍麻	胃潰瘍	**	血管障害	高血圧	潮紅、ほてり、血管炎、血栓症、低血圧	
**	全身障害	疲労(22.9%)、発熱、無力症、倦怠感	浮腫、粘膜の炎症、悪寒、インフルエンザ様疾患	顔面浮腫、口渴、疼痛、注射部位反応、腫脹、胸部不快感、全身健康状態低下、胸痛		**	その他	体重減少	血中LDH増加、CRP増加、血中CK増加、体重増加、細胞マーカー増加、瘻孔	血中CK減少、硬膜下血腫、真珠腫、気管出血、乳頭痛、組織球性壞死性リンパ節炎
	免疫系障害			リウマチ因子增加、サルコイドーシス	リウマチ因子陽性、抗核抗体增加、補体因子增加、抗リン脂質抗体陽性、インターロイキン濃度増加					
**	感染症		肺感染	気管支炎、気道感染、蜂巣炎、歯肉炎、帯状疱疹、尿路感染、膿疱性皮疹、鼻咽頭炎、歯周炎、爪感染、結膜炎	癰、外耳炎、中耳炎					

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 バイアルは振盪せず、激しく搅拌しないこと。

* 14.1.2 本剤は日局生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液に希釈する。なお、1回240mg、360mg又は480mg投与時の総液量は体重30kg以上の患者には150mL以下、体重30kg未満の患者には100mL以下とする。

3mg/kg投与時は最終濃度が0.35mg/mL以上となるように希釈する。

14.1.3 添加後は静かに混和し、急激な振盪は避けること。

14.1.4 希釈後の液は速やかに使用すること。また、使用後も残液は、細菌汚染のおそれがあるので使用しないこと。

14.1.5 希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、本剤の点滴溶液中の安定性が確認されていない。

14.1.6 他剤との混注はしないこと。

14.2 薬剤投与時の注意

本剤の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

- 15.1.1 国内外において本剤に対する抗体の産生が報告されている。
15.1.2 海外臨床試験において、本剤による治療後に同種造血幹細胞移植が実施された症例で、重篤な移植片対宿主病等の移植関連合併症が認められた²³⁾。

15.2 非臨床試験に基づく情報

サルに本剤 50mg/kg を週1回、4週間反復投与した結果、脈絡叢へのリンパ球及び形質細胞浸潤が認められたとの報告がある。


16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

日本人悪性腫瘍患者に本剤 1~20mg/kg を1時間以上かけて単回静脈内持続投与^{注1)}したときの血清中濃度推移及び薬物動態パラメータを以下に示す。全身クリアランス (CL) は投与量間で概ね同様の値を示し、分布容積 (Vss) は体重あたりの血漿量 (約 50mL/kg) に近い値を示した⁴⁾。

(平均値+標準偏差、1mg/kg:n=3、3mg/kg:n=5、10mg/kg:n=6、20mg/kg:n=3)




投与量	1mg/kg (n=3)	3mg/kg (n=5)	10mg/kg (n=6)	20mg/kg (n=3)
Cmax(μg/mL)	24.4±4.5	68.8±10.9	192±36	214±68
Tmax(hr)	3.0(1.0-9.0)	1.0(1.0-3.0)	3.0(1.0-9.0)	9.0(3.0-25)
AUC ₀₋₅₀₄ (μg·hr/mL)	4950±580	12300±4500	43900±7200	67400±15500
T _{1/2} (hr)	360±10	320±170	520±270	410±230
CL(mL/hr/kg)	0.127±0.020	0.210±0.152	0.126±0.027	0.206±0.143
Vss(mL/kg)	64.6±6.7	69.7±10.2	83.6±27.4	96.8±12.1

平均値±標準偏差、Tmax: 中央値 (範囲)

16.1.2 反復投与

〈悪性黒色腫〉

日本人悪性黒色腫患者に本剤 2mg/kg を3週間に1回反復静脈内持続投与^{注1)}したときの投与終了時の血清中濃度及びトラフ濃度の推移を以下に示す。投与終了時の血清中濃度及びトラフ濃度は投与18週以降概ね一定に推移し、投与18週目には定常状態に達した⁵⁾。



〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉

日本人悪性胸膜中皮腫患者に本剤 240mg を2週間に1回反復静脈内持続投与したとき、投与後2週、4週及び18週の血清中トラフ濃度の平均値±標準偏差は、それぞれ 20.5±6.02 μg/mL、38.4±12.5 μg/mL 及び 60.9±27.2 μg/mL であった。

16.1.3 母集団薬物動態解析

国内外の臨床試験24試験で得られたデータを用いて母集団薬物動態解析を実施した。この解析に含まれた日本人患者420例について、本剤 240mg を2週間間隔 (Q2W) 又は 480mg を4週間間隔 (Q4W) で投与した際の薬物動態パラメータ (推定値) は、表のとおりであった。

	用法・用量	C _{max} (μg/mL)	C _{avg} (μg/mL)	C _{min} (μg/mL)
初回投与後	240mgQ2W	72.6 (21.9)	43.7 (20.6)	37.8 (26.9)
	480mgQ4W	145 (21.9)	52.9 (21.7)	28.3 (31.7)
定常状態	240mgQ2W	161 (27.5)	108 (34.7)	84.7 (40.9)
	480mgQ4W	218 (24.3)	108 (34.7)	67.6 (46.7)

幾何平均値 (変動係数%)、C_{avg}: 平均血清中濃度

*16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 小児等

日本人の1歳以上24歳以下の難治性のホジキンリンパ腫の小児患者及び難治性の小児悪性固形腫瘍患者に本剤 3mg/kg を2週間に1回反復静脈内持続投与したとき、単回投与時のC_{max}は 46.4±8.7 μg/mL、AUC₀₋₃₃₆は 7.224±1.635 μg·hr/mL 及び T_{1/2}は 347±108hr であった (n=26)。また、投与後2週、4週、8週、12週及び18週の血清中トラフ濃度の平均値±標準偏差は、それぞれ 15.6±3.4 μg/mL、27.7±7.2 μg/mL、41.7±12.7 μg/mL、51.1±17.6 μg/mL 及び 57.4±24.7 μg/mL であった (n=7~24)。

16.8 その他

本剤の有効性及び安全性に対する曝露-反応解析の結果、本剤 240mg をQ2Wで投与した際と本剤 480mg をQ4Wで投与した際の有効性及び安全性に明確な差異はないと予測された。

注) 本剤の承認された単回投与の用法及び用量は「通常、成人にはニボルマブ (遺伝子組換え) として、1回 240mg を2週間間隔又は1回 480mg を4週間間隔で点滴静注する。」である。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈悪性黒色腫〉

17.1.1 国内第Ⅱ相試験 (ONO-4538-02 試験)

ダカルバジンによる化学療法歴を有する根治切除不能なⅢ期/Ⅳ期又は再発の悪性黒色腫患者35例を対象に、本剤 2mg/kg を3週間間隔で点滴静注^{注1)}した。主要評価項目である奏効率 (RECIST ガイドライン 1.1 版に基づく中央判定による CR 又は PR) は 22.9% (90% 信頼区間: 13.4~36.2%*) であった。なお、事前に設定した閾値は 12.5% であった。また、安全性評価対象 35 例中 30 例 (85.7%) に副作用 (臨床検査値異常を含む) が認められた。主な副作用は、そう痒症 11 例 (31.4%)、遊離 T3 減少 8 例 (22.9%)、血中 TSH 増加 7 例 (20.0%)、白血球数減少 6 例 (17.1%)、遊離 T4 減少 6 例 (17.1%)、白斑 6 例 (17.1%) であった⁵⁾。[5.1 参照]

	例数 (%)
完全奏効 (CR)	1 (2.9)
部分奏効 (PR)	7 (20.0)
安定 (SD)	15 (42.9)
進行 (PD)	11 (31.4)
評価不能	1 (2.9)

*1: Wilsonのスコア法を用いた近似法により求めた信頼区間。一方、二項分布の確率計算に基づく正確法により求めた90%信頼区間は 11.9~37.5% であった。


17.1.2 国内第Ⅱ相試験 (ONO-4538-08 試験)

化学療法未治療の根治切除不能なⅢ期/Ⅳ期又は再発の悪性黒色腫患者 24 例を対象に、本剤 3mg/kg を2週間間隔で点滴静注^{注1)}した。主要評価項目である奏効率 (RECIST ガイドライン 1.1 版に基づく中央判定による CR 又は PR) は 29.2% (90% 信頼区間: 16.7~45.9%) であった。なお、事前に設定した閾値は 6.0% であった。また、安全性評価対象 24 例中 18 例 (75.0%) に副作用 (臨床検査値異常を含む) が認められた。主な副作用は、甲状腺機能低下症 6 例 (25.0%)、白斑 5 例 (20.8%)、そう痒症 5 例 (20.8%)、倦怠感 4 例 (16.7%) であった⁶⁾。[5.1 参照]

	例数 (%)
完全奏効 (CR)	0 (0.0)
部分奏効 (PR)	7 (29.2)
安 定 (SD)	9 (37.5)
進 行 (PD)	7 (29.2)
評価不能	1 (4.2)

17.1.3 海外第Ⅲ相試験 (CA209066 試験)

BRAF V600 変異のない化学療法未治療の根治切除不能なⅢ期/Ⅳ期又は再発の悪性黒色腫患者418例（本剤群210例、ダカルバジン群208例）を対象に、ダカルバジンを対照として本剤3mg/kgを2週間隔で点滴静注¹⁾したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である全生存期間（中央値[95%信頼区間]）の中間解析結果は、本剤群でNE²⁾[NE～NE]カ月、ダカルバジン群で10.84[9.33～12.09]カ月であり、本剤はダカルバジンに対し統計学的に有意な延長を示した（ハザード比0.42[99.79%信頼区間:0.25～0.73]、p<0.0001[層別log-rank検定]、2014年6月24日データカットオフ）。また、安全性評価対象206例中153例（74.3%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、疲労41例（19.9%）、そう痒症35例（17.0%）、恶心34例（16.5%）、下痢33例（16.0%）、発疹31例（15.0%）であった⁷⁾。[5.1参照]



*2 : NEは推定不能

17.1.4 海外第Ⅲ相試験 (CA209037 試験)

イピリュマブ（遺伝子組換え）又はBRAF阻害剤を含む化学療法歴を有する根治切除不能なⅢ期/Ⅳ期又は再発の悪性黒色腫患者405例（本剤群272例、化学療法（ダカルバジン又はカルボプラチントーパクリタキセルとの併用）群133例）を対象に、化学療法を対照として本剤3mg/kgを2週間隔で点滴静注¹⁾したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である奏効率（RECISTガイドライン1.1版に基づく中央判定によるCR又はPR）について本剤が投与された最初の120例を解析対象集団として中間解析を行った結果、本剤群で31.7%（95%信頼区間:23.5～40.8%、2014年3月10日データカットオフ）であった。なお、事前に奏効率の閾値は設定していないかった。もう一つの主要評価項目である全生存期間（中央値[95%信頼区間]）について182例のイベント（死亡）数にて中間解析を行った結果、本剤群で15.47[12.39～NE³⁾]カ月、化学療法群で13.67[11.50～NE³⁾]カ月であり、本剤は化学療法に対し統計学的に有意な延長を示さなかった（ハザード比0.93[95%信頼区間:0.68～1.26]、p=0.6299[層別log-rank検定]、2014年11月12日データカットオフ）。また、安全性評価対象268例中199例（74.3%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、疲労82例（30.6%）、そう痒症51例（19.0%）、下痢42例（15.7%）、発疹34例（12.7%）、恶心33例（12.3%）であった^{8,9)}。[5.1参照]

	例数 (%)
完全奏効 (CR)	4 (3.3)
部分奏効 (PR)	34 (28.3)
安 定 (SD)	28 (23.3)
進 行 (PD)	42 (35.0)
評価不能	12 (10.0)

*3 : NEは推定不能


17.1.5 国内第Ⅱ相試験 (ONO-4538-17 試験)

化学療法未治療の根治切除不能なⅢ期/Ⅳ期又は再発の悪性黒色腫患者30例を対象に、本剤とイピリュマブ（遺伝子組換え）を併用投与した⁴⁾。主要評価項目である奏効率（RECISTガイドライン1.1版に基づく中央判定によるCR又はPR）は33.3%（95%信頼区間:17.3～52.8%）であった。なお、事前に設定した閾値は23.8%であった。また、安全性評価対象30例中30例（100%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、発疹18例（60.0%）、下痢16例（53.3%）、発熱12例（40.0%）、リバーゼ増加12例（40.0%）、ALT増加11例（36.7%）、AST増加11例（36.7%）、そう痒症10例（33.3%）、食欲減退8例（26.7%）、倦怠感7例（23.3%）、甲状腺機能低下症7例（23.3%）、肝機能異常7例（23.3%）、嘔吐6例（20.0%）であった¹⁰⁾。[5.1参照]

	例数 (%)
完全奏効 (CR)	1 (3.3)
部分奏効 (PR)	9 (30.0)
安 定 (SD)	12 (40.0)
進 行 (PD)	7 (23.3)
評価不能	1 (3.3)


17.1.6 海外第Ⅲ相試験 (CA209067 試験)

化学療法未治療の根治切除不能なⅢ期/Ⅳ期の悪性黒色腫患者945例（イピリュマブ（遺伝子組換え）併用（N+I併用）⁴⁾群314例、本剤単独群316例、イピリュマブ（遺伝子組換え）単独（I単独）群315例）を対象に、I単独投与を対照としてN+I併用投与と本剤単独投与の有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である全生存期間（中央値[95%信頼区間]）は、N+I併用群でNE⁵⁾[NE～NE]カ月、本剤単独群でNE⁵⁾[29.08～NE]カ月、I単独群で19.98[17.08～24.61]カ月であり、N+I併用投与及び本剤単独投与はI単独投与に対し統計学的に有意な延長を示した（N+I併用投与:ハザード比0.55[98%信頼区間:0.42～0.72]、p<0.0001[層別log-rank検定]、本剤単独投与:ハザード比0.63[98%信頼区間:0.48～0.81]、p<0.0001[層別log-rank検定]、2016年8月1日データカットオフ）。N+I併用投与群では安全性評価対象313例中300例（95.8%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められ、主な副作用は、下痢142例（45.4%）、疲労118例（37.7%）、そう痒症112例（35.8%）、発疹91例（29.1%）、恶心88例（28.1%）であった¹¹⁾。




本剤単独群 316 292 265 244 230 213 201 191 181 175 157 155 3 0
イピリュマブ併用群 314 292 265 247 226 221 209 200 198 192 170 49 7 0
イピリュマブ単独群 315 285 254 228 205 182 164 149 136 129 104 34 4 0

また、腫瘍組織においてPD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合（以下、「PD-L1発現率」）に関する情報が得られた一部の患者のデータに基づき、PD-L1発現率別に探索的に解析を行った。PD-L1発現率別（1%未満及び1%以上）の全生存期間の結果を以下に示す。[5.1、7.2参照]



	at risk数	生存期間(月)	本剤単独群	117	103	86	76	73	65	62	59	57	55	50	16	2	0
イビリムマブ併用群	123	113	102	91	82	82	79	74	74	72	66	18	4	0			
イビリムマブ単独群	113	96	87	79	71	61	57	50	44	43	32	10	1	0			



	at risk数	生存期間(月)	本剤単独群	171	165	158	148	139	131	122	117	112	109	98	36	1	0
イビリムマブ併用群	155	144	132	127	116	112	105	102	101	99	85	27	3	0			
イビリムマブ単独群	164	155	138	126	115	102	89	83	77	74	64	21	2	0			


PD-L1 発現率	投与群	例数	中央値 [95%信頼区間] (ヶ月)*5	ハザード比 [95%信頼区間]
<1%	N+I併用群	123	NE [26.45~NE]	0.59 [0.42~0.83]
	I単独群	113	18.56 [13.67~23.20]	
≥1%	N+I併用群	155	NE [NE~NE]	0.54 [0.39~0.74]
	I単独群	164	22.11 [17.08~29.67]	
<1%	N+I併用群	123	NE [26.45~NE]	0.74 [0.52~1.06]
	本剤単独群	117	23.46 [13.01~NE]	
≥1%	N+I併用群	155	NE [NE~NE]	1.03 [0.72~1.48]
	本剤単独群	171	NE [NE~NE]	

*4: 本剤1回1mg/kg(体重)とイビリムマブ(遺伝子組換え)3mg/kg(体重)を同日に3週間間隔で4回点滴静注した後、本剤1回3mg/kg(体重)を2週間間隔で点滴静注^{注2)}した。併用投与時においては、本剤を最初に投与し、イビリムマブ(遺伝子組換え)は本剤の投与終了から30分以上の間隔をおいて投与を開始した。

*5: NEは推定不能

17.1.7 国際共同第Ⅲ相試験 (ONO-4538-21/CA209238試験)

完全切除後のⅢb/c期/Ⅳ期の悪性黒色腫患者906例(日本人患者28例を含む)。本剤群453例、イビリムマブ(遺伝子組換え)群453例)を対象に、イビリムマブ(遺伝子組換え)^{*6}を対照として本剤3mg/kgを2週間間隔で点滴静注^{注1)}したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である無再発生存期間(中央値[95%信頼区間])の中間解析結果は、本剤群でNE^{*7}[NE~NE]ヶ月、イビリムマブ(遺伝子組換え)群でNE^{*7}[16.56~NE]ヶ月であり、本剤はイビリムマブ(遺伝子組換え)に対し統計学的に有意な延長を示した(ハザード比0.65[97.56%信頼区間:0.51~0.83]、p<0.0001[層別log-rank検定]、2017年6月12日データカットオフ)。また、安全性評価対象452例中385例(85.2%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、疲労156例(34.5%)、下痢110例(24.3%)、そう痒症105例(23.2%)、発疹90例(19.9%)、恶心68例(15.0%)であった¹²⁾。[5.1参照]



*6: イビリムマブ(遺伝子組換え)は、本邦において悪性黒色腫に対する術後補助療法の効能・効果では承認されていない。

*7: NEは推定不能

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

17.1.8 扁平上皮癌


(1) 国内第Ⅱ相試験 (ONO-4538-05試験)

プラチナ製剤を含む化学療法歴を有する切除不能なⅢB期/Ⅳ期又は再発の扁平上皮非小細胞肺癌患者(ECOG Performance Status 0及び1)35例を対象に、本剤3mg/kgを2週間間隔で点滴静注^{注1)}した。主要評価項目である奏効率(RECISTガイドライン1.1版に基づく中央判定によるCR又はPR)は25.7%(95%信頼区間:14.2~42.1%)であった。なお、事前に設定した閾値は9.0%であった。また、安全性評価対象35例中24例(68.6%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、倦怠感5例(14.3%)、発熱5例(14.3%)、食欲減退5例(14.3%)、発疹5例(14.3%)であった¹³⁾。

	例数 (%)
完全奏効(CR)	0 (0.0)
部分奏効(PR)	9 (25.7)
安定(SD)	10 (28.6)
進行(PD)	16 (45.7)
評価不能	0 (0.0)

(2) 海外第Ⅲ相試験 (CA209017試験)

プラチナ製剤を含む化学療法歴を有する切除不能なⅢB期/Ⅳ期又は再発の扁平上皮非小細胞肺癌患者(ECOG Performance Status 0及び1)272例(本剤群135例、ドセタキセル群137例)を対象に、ドセタキセルを対照として本剤3mg/kgを2週間間隔で点滴静注^{注1)}したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である全生存期間(中央値[95%信頼区間])の中間解析結果は、本剤群で9.23[7.33~13.27]ヶ月、ドセタキセル群で6.01[5.13~7.33]ヶ月であり、本剤はドセタキセルに対し統計学的に有意な延長を示した(ハザード比0.59[96.85%信頼区間:0.43~0.81]、p=0.0002[層別log-rank検定]、2014年12月15日データカットオフ)。また、安全性評価対象131例中76例(58.0%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、疲労21例(16.0%)、食欲減退14例(10.7%)であった¹⁴⁾。



at risk数	生存期間(月)	本剤群	ドセタキセル群
135	113	86	68
69	52	31	45
52	31	15	30
31	15	7	14
15	7	0	7
7	0	0	2

17.1.9 非扁平上皮癌


(1) 国内第Ⅱ相試験 (ONO-4538-06 試験)

プラチナ製剤を含む化学療法歴を有する切除不能なⅢB期/Ⅳ期又は再発の非扁平上皮非小細胞肺癌患者 (ECOG Performance Status 0 及び 1) 76 例を対象に、本剤 3mg/kg を 2 週間間隔で点滴静注¹⁾した。主要評価項目である奏効率 (RECIST ガイドライン 1.1 版に基づく中央判定による CR 又は PR) は 19.7% (95% 信頼区間: 12.3 ~ 30.0%) であった。なお、事前に設定した閾値は 9.0% であった。また、安全性評価対象 76 例中 64 例 (84.2%) に副作用 (臨床検査値異常を含む) が認められた。主な副作用は、倦怠感 11 例 (14.5%)、発熱 11 例 (14.5%)、食欲減退 11 例 (14.5%)、発疹 11 例 (14.5%)、疲労 9 例 (11.8%)、恶心 8 例 (10.5%) であった¹⁵⁾。

	例数 (%)
完全奏効 (CR)	2 (2.6)
部分奏効 (PR)	13 (17.1)
安定 (SD)	21 (27.6)
進行 (PD)	38 (50.0)
評価不能	1 (1.3)
測定可能病変なし	1 (1.3)


(2) 海外第Ⅲ相試験 (CA209057 試験)

プラチナ製剤を含む化学療法歴を有する切除不能なⅢB期/Ⅳ期又は再発の非扁平上皮非小細胞肺癌患者 (ECOG Performance Status 0 及び 1) 582 例 (本剤群 292 例、ドセタキセル群 290 例) を対象に、ドセタキセルを対照として本剤 3mg/kg を 2 週間間隔で点滴静注¹⁾したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である全生存期間 (中央値 [95% 信頼区間]) の中間解析結果は、本剤群で 12.19 [9.66 ~ 14.98] ヶ月、ドセタキセル群で 9.36 [8.05 ~ 10.68] ヶ月であり、本剤はドセタキセルに対し統計学的に有意な延長を示した (ハザード比 0.73 [95.92% 信頼区間: 0.59 ~ 0.89]、p=0.0015 [層別 log-rank 検定]、2015 年 3 月 18 日データカットオフ)。また、安全性評価対象 287 例中 199 例 (69.3%) に副作用 (臨床検査値異常を含む) が認められた。主な副作用は、疲労 46 例 (16.0%)、恶心 34 例 (11.8%)、食欲減退 30 例 (10.5%)、無力症 29 例 (10.1%) であった¹⁶⁾。



(3) 国際共同第Ⅲ相試験 (ONO-4538-52 試験)


化学療法未治療の EGFR 遺伝子変異陰性、ALK 融合遺伝子陰性及び ROS1 融合遺伝子陰性の切除不能な進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺癌患者 550 例 (日本人患者 371 例) を含む。本剤とプラチナ製剤及びベバシズマブ (遺伝子組換え) を含む化学療法との併用 (N+C 併用)⁸⁾ 群 275 例、プラセボとプラチナ製剤及びベバシズマブ (遺伝子組換え) を含む化学療法との併用 (P+C 併用) 群 275 例) を対象に、P+C 併用を対照として、N+C 併用群の有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である無増悪生存期間 (中央値 [95% 信頼区間]) は、N+C 併用群で 12.12 [9.76 ~ 14.00] ヶ月、P+C 併用群で 8.11 [6.97 ~ 8.54] ヶ月であり、N+C 併用投与は P+C 併用投与に対し統計学的に有意な延長を示した (ハザード比 0.56 [96.37% 信頼区間: 0.43 ~ 0.71]、p<0.0001 [層別 log-rank 検定]、2020 年 2 月 10 日データカットオフ)。また、安全性評価対象 273 例中 269 例 (98.5%) に副作用 (臨床検査値異常を含む) が認められた。主な副作用は、脱毛 143 例 (52.4%)、末梢性感觉ニューロパチー 120 例 (44.0%)、好中球数減少 116 例 (42.5%)、白血球数減少 93 例 (34.1%)、便秘 85 例 (31.1%)、食欲減退 81 例 (29.7%)、発疹 81 例 (29.7%)、貧血 78 例 (28.6%)、関節痛 69 例 (25.3%) であった¹⁷⁾。[5.2 参照]



*8: 本剤 1 回 360mg、カルボプラチナ 1 回 AUC6 (mg/mL · min)、パクリタキセル 1 回 200mg/m²、ベバシズマブ (遺伝子組換え) 1 回 15mg/kg を 3 週間間隔で最大 6 サイクル点滴静注した後、本剤 1 回 360mg 及びベバシズマブ (遺伝子組換え) 1 回 15mg/kg を 3 週間間隔で点滴静注した。
併用投与時においては、本剤を最初に投与し、化学療法は本剤の投与終了から 30 分以上の間隔をおいて投与を開始した。

17.1.10 国際共同第Ⅲ相試験 (ONO-4538-27/CA209227 試験)

化学療法未治療の EGFR 遺伝子変異陰性及び ALK 融合遺伝子陰性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者 1,166 例 (日本人患者 143 例) を含む。イピリムマブ (遺伝子組換え) 併用 (N+I 併用)^{*9} 群 583 例、プラチナ製剤を含む化学療法群 583 例) を対象に、化学療法を対照として、N+I 併用群の有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である PD-L1 発現率が 1% 以上の患者 (N+I 併用群 396 例、化学療法群 397 例) における全生存期間 (中央値 [95% 信頼区間]) は、N+I 併用群で 17.08 [14.95 ~ 20.07] ヶ月、化学療法群で 14.88 [12.71 ~ 16.72] ヶ月であり、N+I 併用投与は化学療法に対し統計学的に有意な延長を示した (ハザード比 0.79 [97.72% 信頼区間: 0.65 ~ 0.96]、p=0.0066 [層別 log-rank 検定]、2019 年 7 月 2 日データカットオフ)。また、安全性評価対象 391 例中 302 例 (77.2%) に副作用 (臨床検査値異常を含む) が認められた。主な副作用は、発疹 73 例 (18.7%)、下痢 70 例 (17.9%)、そう痒症 62 例 (15.9%)、疲労 56 例 (14.3%)、甲状腺機能低下症 53 例 (13.6%)、食欲減退 53 例 (13.6%)、恶心 42 例 (10.7%) であった¹⁸⁾。




*9: 本剤 1 回 3mg/kg (体重) を 2 週間間隔³⁾ で、イピリムマブ (遺伝子組換え) 1 回 1mg/kg (体重) を同日に 6 週間間隔で点滴静注

検定対象とされなかった PD-L1 発現率が 1% 未満の患者 (N+I 併用群 187 例、化学療法群 186 例) における全生存期間 (中央値 [95% 信頼区間]) は、N+I 併用群で 17.15 [12.85 ~ 22.05] ヶ月、化学療法群で 12.19 [9.17 ~ 14.32] ヶ月であり、ハザード比 0.62 [95% 信頼区間: 0.48 ~ 0.78] であった (2019 年 7 月 2 日データカットオフ)。また、安全性評価対象 185 例中 140 例 (75.7%) に副作用 (臨床検査値異常を含む) が認められた。主な副作用は、下痢 28 例 (15.1%)、疲労 27 例 (14.6%)、発疹 25 例 (13.5%)、食欲減退 23 例 (12.4%)、無力症 21 例 (11.4%)、ALT 増加 21 例 (11.4%)、リバーゼ増加 21 例 (11.4%)、そう痒症 20 例 (10.8%)、AST 増加 20 例 (10.8%)、甲状腺機能低下症 19 例 (10.3%) であった¹⁸⁾。

*9: 本剤 1 回 3mg/kg (体重) を 2 週間間隔³⁾ で、イピリムマブ (遺伝子組換え) 1 回 1mg/kg (体重) を同日に 6 週間間隔で点滴静注

した。併用投与時においては、本剤を最初に投与し、イピリムマブ（遺伝子組換え）は本剤の投与終了から30分以上の間隔をおいて投与を開始した。

化学療法未治療でPD-L1発現率が1%未満のEGFR遺伝子変異陰性及びALK融合遺伝子陰性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者363例（日本人患者54例を含む）。プラチナ製剤を含む化学療法併用（N+C併用）^{*10}群177例、プラチナ製剤を含む化学療法群186例）を対象に、化学療法を対照として、N+C併用群の有効性及び安全性を検討した。本試験の副次評価項目の一つであり階層的な検定の対象である無増悪生存期間（中央値[95%信頼区間]）は、N+C併用群で5.55[4.63～6.90]ヶ月、化学療法群で4.70[4.21～5.59]ヶ月であり、N+C併用投与は化学療法に対し統計学的に有意な延長を示した（ハザード比0.73[97.72%信頼区間:0.56～0.95]、p=0.0070[層別log-rank検定]、2019年7月2日データカットオフ）。なお、本試験の副次評価項目の一つであり階層的な検定の対象である全生存期間（中央値[95%信頼区間]）は、N+C併用群で15.21[12.29～19.78]ヶ月、化学療法群で12.19[9.17～14.32]ヶ月であり、N+C併用投与は化学療法に対し統計学的に有意な延長を示さなかった（ハザード比0.78[97.72%信頼区間:0.60～1.02]、p=0.0352[層別log-rank検定]、2019年7月2日データカットオフ）。また、安全性評価対象172例中159例（92.4%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、貧血70例（40.7%）、悪心67例（39.0%）、疲労43例（25.0%）、好中球減少症41例（23.8%）、食欲減退39例（22.7%）、便秘38例（22.1%）、好中球数減少27例（15.7%）、嘔吐26例（15.1%）、発疹26例（15.1%）、血小板数減少21例（12.2%）、無力症18例（10.5%）であった¹⁸。[5.2、7.4参照]




*10: 扁平上皮癌に対しては、本剤1回360mg、ゲムシタビン1回1000mg若しくは1250mg/m²、シスプラチニン1回75mg/m²又は本剤1回360mg、ゲムシタビン1回1000mg/m²、カルボプラチニン1回AUC5(mg/mL・min)を3週間間隔で最大4サイクル点滴静注した後、本剤1回360mgを3週間間隔で点滴静注した。ゲムシタビンは各サイクル1日目及び8日目に点滴静注した。
非扁平上皮癌に対しては、本剤1回360mg、ペメトレキセド1回500mg/m²、シスプラチニン1回75mg/m²又はカルボプラチニン1回AUC5若しくは6(mg/mL・min)を3週間間隔で最大4サイクル点滴静注した後、本剤1回360mg及びペメトレキセド1回500mg/m²を3週間間隔で点滴静注した。

併用投与時においては、本剤を最初に投与し、化学療法は本剤の投与終了から30分以上の間隔をおいて投与を開始した。

17.1.11 国際共同第Ⅲ相試験（ONO-4538-77/CA2099LA試験）

化学療法未治療のEGFR遺伝子変異陰性及びALK融合遺伝子陰性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者719例（日本人患者50例を含む）。イピリムマブ（遺伝子組換え）及びプラチナ製剤を含む化学療法併用（N+I+C併用）^{*11}群361例、プラチナ製剤を含む化学療法群358例）を対象に、化学療法を対照として、N+I+C併用群の有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である全生存期間（中央値[95%信頼区間]）は、N+I+C併用群で14.13[13.24～16.16]ヶ月、化学療法群で10.74[9.46～12.45]ヶ月であり、N+I+C併用投与は化学療法に対し統計学的に有意な延長を示した（ハザード比0.69[96.71%信頼区間:0.55～0.87]、p=0.0006[層別log-rank検定]、2019年10月3日データカットオフ）。また、安全性評価対象358例中322例（89.9%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、悪心94例（26.3%）、貧血80例（22.3%）、下痢73例（20.4%）、無力症73例（20.4%）、そう痒症66例（18.4%）、発疹64例（17.9%）、疲労59例（16.5%）、食欲減退56例（15.6%）、甲状腺機能低下症52例（14.5%）、嘔吐47例（13.1%）であった¹⁹。[5.2参照]



*11: 扁平上皮癌に対しては、本剤1回360mgを3週間間隔、イピリムマブ（遺伝子組換え）1回1mg/kg（体重）を6週間間隔、パクリタキセル1回200mg/m²、カルボプラチニン1回AUC6(mg/mL・min)を3週間間隔で2サイクル点滴静注した後、本剤1回360mgを3週間間隔及びイピリムマブ（遺伝子組換え）1回1mg/kg（体重）を6週間間隔で点滴静注した。


非扁平上皮癌に対しては、本剤1回360mgを3週間間隔、イピリムマブ（遺伝子組換え）1回1mg/kg（体重）を6週間間隔、ペメトレキセド1回500mg/m²、シスプラチニン1回75mg/m²又はカルボプラチニン1回AUC5若しくは6(mg/mL・min)を3週間間隔で2サイクル点滴静注した後、本剤1回360mgを3週間間隔及びイピリムマブ（遺伝子組換え）1回1mg/kg（体重）を6週間間隔で点滴静注した。

併用投与時においては、本剤を最初に投与し、イピリムマブ（遺伝子組換え）（イピリムマブの投与を予定している場合）は本剤の投与終了から30分以上の間隔をおいて投与を開始した。また、化学療法は本剤又はイピリムマブ（遺伝子組換え）（イピリムマブの投与を予定している場合）の投与終了から30分以上の間隔をおいて投与を開始した。

（根治切除不能又は転移性の腎細胞癌）


17.1.12 国際共同第Ⅲ相試験（ONO-4538-03/CA209025試験）

血管新生阻害作用を有する抗悪性腫瘍剤（アキシチニブ、スニチニブ、ソラフェニブ、バゾバニブ等）を含む化学療法歴を有する進行性又は転移性の淡明細胞型腎細胞癌患者821例（日本人患者63例を含む）。本剤群410例、エペロリムス群411例）を対象に、エペロリムスを対照として本剤3mg/kgを2週間間隔で点滴静注¹¹⁾したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である全生存期間（中央値[95%信頼区間]）の中間解析結果は、本剤群で25.00[21.75～NE*12]ヶ月、エペロリムス群で19.55[17.64～23.06]ヶ月であり、本剤はエペロリムスに対し統計学的に有意な延長を示した（ハザード比0.73[98.52%信頼区間:0.57～0.93]、p=0.0018[層別log-rank検定]、2015年6月18日データカットオフ）。また、安全性評価対象406例中319例（78.6%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、疲労134例（33.0%）、悪心57例（14.0%）、そう痒症57例（14.0%）、下痢50例（12.3%）、食欲減退48例（11.8%）、発疹41例（10.1%）であった²⁰。[5.6参照]



本剤群 410 389 359 337 305 275 213 139 73 29 3 0
エペロリムス群 411 366 324 287 265 241 187 115 61 20 2 0


また、日本人部分集団63例（本剤群37例、エペロリムス群26例）の全生存期間（中央値[95%信頼区間]）の中間解析結果は、本剤群で27.37[23.62～NE*¹²]ヶ月、エペロリムス群でNE*¹²[NE～NE]ヶ月であった（ハザード比1.50[95%信頼区間:0.49～4.54]、2015年6月18日データカットオフ）。



*12 : NEは推定不能

17.1.13 国際共同第Ⅲ相試験 (ONO-4538-16/CA209214 試験)

化学療法未治療の進行性又は転移性の淡明細胞型腎細胞癌患者1,096例（日本人患者72例を含む）。イピリムマブ（遺伝子組換え）併用（N+I併用）*¹³群550例、スニチニブ群546例）を対象に、スニチニブを対照として、N+I併用群の有効性及び安全性を検討した。主要評価項目であるIMDC*¹⁴リスク分類intermediate及びpoorリスク患者（N+I併用群425例、スニチニブ群422例）の全生存期間（中央値[95%信頼区間]）は、N+I併用群でNE*¹⁵[28.16～NE]ヶ月、スニチニブ群で25.95[22.08～NE*¹⁵]ヶ月であり、N+I併用投与はスニチニブに対し統計学的に有意な延長を示した（ハザード比0.63[99.8%信頼区間:0.44～0.89]、p<0.0001[層別log-rank検定]、2017年8月7日データカットオフ）。また、安全性評価対象547例中509例（93.1%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、疲労202例（36.9%）、そう痒症154例（28.2%）、下痢145例（26.5%）、発疹118例（21.6%）、恶心109例（19.9%）、リバーゼ増加90例（16.5%）、甲状腺機能低下症85例（15.5%）であった²¹。[5.6参照]



*13 : 本剤1回3mg/kg（体重）とイピリムマブ（遺伝子組換え）1回1mg/kg（体重）を同日に3週間間隔で4回点滴静注した後、本剤1回3mg/kg（体重）を2週間間隔で点滴静注^{注4}した。併用投与時においては、本剤を最初に投与し、イピリムマブ（遺伝子組換え）は本剤の投与終了から30分以上の間隔をおいて投与を開始した。


*14 : International Metastatic RCC Database Consortium

*15 : NEは推定不能

17.1.14 国際共同第Ⅲ相試験 (ONO-4538-81/CA2099ER 試験)

化学療法未治療の進行性又は転移性の淡明細胞型腎細胞癌患者651例（日本人患者46例を含む）。カボザンチニブ併用（N+C併用群）*¹⁶群323例、スニチニブ群328例）を対象に、スニチニブを対照として、N+C併用群の有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である無増悪生存期間（中央値[95%信頼区間]）の結果は、N+C併用群で16.59[12.45～24.94]ヶ月、スニチニブ群で8.31[6.97～9.69]ヶ月であり、N+C併用群はスニチニブ群に対し統計学的に有意な延長

を示した（ハザード比0.51[95%信頼区間:0.41～0.64]、p<0.0001[層別log-rank検定]、2020年2月12日データカットオフ）。また、安全性評価対象320例中309例（96.6%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、下痢182例（56.9%）、手足・足底発赤知覚不全症候群122例（38.1%）、甲状腺機能低下症107例（33.4%）、高血圧97例（30.3%）、疲労86例（26.9%）、ALT増加80例（25.0%）、AST増加75例（23.4%）、味覚不全69例（21.6%）、恶心68例（21.3%）、食欲減退65例（20.3%）であった²²。[5.6参照]



*16 : 本剤1回240mgを2週間間隔で点滴静注し、カボザンチニブ40mgを1日1回経口投与した。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉

17.1.15 国内第Ⅱ相試験 (ONO-4538-15 試験)

自家造血幹細胞移植及びブレンツキシマブベドチン（遺伝子組換え）に抵抗性又は不耐容の再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫患者（ECOG Performance Status 0及び1）17例を対象に、本剤3mg/kgを2週間間隔で点滴静注^{注6}した。主要評価項目である奏効率（改訂IWG criteria（2007）に基づく中央判定によるCR又はPR）は75.0%（95%信頼区間:47.6～92.7%）であった。なお、事前に設定した閾値は20.0%であった。また、安全性評価対象17例中17例（100%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、発熱7例（41.2%）、そう痒症5例（29.4%）、発疹4例（23.5%）、甲状腺機能低下症3例（17.6%）、疲労2例（11.8%）、倦怠感2例（11.8%）、筋肉痛2例（11.8%）であった²³。[5.7参照]

	例数 (%)
完全寛解 (CR)	4 (25.0)
部分寛解 (PR)	8 (50.0)
安 定 (SD)	2 (12.5)
進 行 (PD)	1 (6.3)
評価不能	1 (6.3)

有効性評価対象16例の試験成績を示した。

17.1.16 海外第Ⅱ相試験 (CA209205 試験)

自家造血幹細胞移植施行後にブレンツキシマブベドチン（遺伝子組換え）による治療を受けた再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫患者（コホートB、ECOG Performance Status 0及び1）80例を対象に、本剤3mg/kgを2週間間隔で点滴静注^{注6}した。主要評価項目である奏効率（改訂IWG criteria（2007）に基づく中央判定によるCR又はPR）は66.3%（95%信頼区間:54.8～76.4%）であった。なお、事前に設定した閾値は20.0%であった。また、安全性評価対象80例中72例（90.0%）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、疲労20例（25.0%）、注入に伴う反応16例（20.0%）、発疹13例（16.3%）、発熱11例（13.8%）、関節痛11例（13.8%）、恶心10例（12.5%）、そう痒症8例（10.0%）、下痢8例（10.0%）であった²⁴。[5.7参照]

	例数 (%)
完全寛解 (CR)	7 (8.8)
部分寛解 (PR)	46 (57.5)
安 定 (SD)	18 (22.5)
進 行 (PD)	6 (7.5)
評価不能	3 (3.8)

*17. 1. 17 国内第I相試験 (NCCH1606 試験)


2レジメン以上の治療歴を有し、かつ同種造血幹細胞移植による治療歴のない1歳以上24歳以下の難治性のホジキンリンパ腫及び難治性の小児悪性固形腫瘍患者^{*17}を対象に、本剤3mg/kgを2週間間隔で点滴静注した。本試験に登録された26例のうち、古典的ホジキンリンパ腫は1例組み入れられ、その最良総合効果(改訂IWG criteria (2007)に基づく治験責任医師判定)は完全寛解(CR)であった。また、安全性評価対象26例中23例(88.5%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、リンパ球数減少14例(53.8%)、貧血12例(46.2%)、白血球数減少8例(30.8%)、血小板数減少8例(30.8%)、アスピラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加6例(23.1%)、好中球数減少6例(23.1%)、斑状丘疹皮疹6例(23.1%)、発熱5例(19.2%)、低アルブミン血症5例(19.2%)、アラニニアミノトランスフェラーゼ増加3例(11.5%)、そう痒症3例(11.5%)、蛋白尿3例(11.5%)であった²⁵⁾。[5.7参考]

*17: 本剤の承認された効能又は効果は「再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫」である。

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉

17. 1. 18 国際共同第III相試験 (ONO-4538-11/CA209141 試験)

プラチナ製剤を含む化学療法^{*18}終了後から6ヵ月以内に病勢進行又は再発が認められた、根治目的の局所療法の適応とならないⅢ期/Ⅳ期の頭頸部扁平上皮癌^{*19}患者361例(日本人患者27例を含む)。本剤群240例、対照群121例)を対象に、治験担当医師が選択した治療(メトトレキサート、ドセタキセル又はセツキシマブ)を対照として本剤3mg/kgを2週間間隔で点滴静注^[注1]したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である全生存期間(中央値[95%信頼区間])の中間解析結果は、本剤群で7.49[5.49~9.10]ヵ月、対照群で5.06[4.04~6.05]ヵ月であり、本剤は治験担当医師が選択した治療に対し統計学的に有意な延長を示した(ハザード比0.70[97.73%信頼区間:0.51~0.96]、p=0.0101[層別log-rank検定]、2015年12月18日データカットオフ)。また、安全性評価対象236例中139例(58.9%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、疲労33例(14.0%)、悪心20例(8.5%)、発疹18例(7.6%)、そう痒症17例(7.2%)、食欲減退17例(7.2%)、下痢16例(6.8%)、貧血12例(5.1%)であった²⁶⁾。[5.10参考]




*18: 根治目的又は術後の化学放射線療法を含む。

*19: 対象とされた原発部位は、口腔、中・下咽頭及び喉頭。

**〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉

17. 1. 19 国際共同第III相試験 (ONO-4538-12 試験)


2つ以上の化学療法歴を有する標準治療に不応又は不耐の治癒切除不能な進行・再発の胃癌又は食道胃接合部癌(腫瘍の中心が食道胃接合部より上下5cm以内に位置する腺癌)患者493例(日本人患者226例を含む)。本剤群330例、プラセボ群163例)を対象に、プラセボを対照として本剤3mg/kgを2週間間隔で点滴静注^[注1]したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である全生存期間(中央値[95%信頼区間])は、本剤群で5.26[4.60~6.37]ヵ月、プラセボ群で4.14[3.42~4.86]ヵ月であり、本剤はプラセボに対し統計学的に有意な延長を示した(ハザード比0.63[95%信頼区間:0.51~0.78]、p<0.0001[層別log-rank検定]、2016年8月13日データカットオフ)。また、安全性評価対象330例中141例(42.7%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、そう痒症30例(9.1%)、下痢23例(7.0%)、発疹19例(5.8%)、疲労18例(5.5%)であった²⁷⁾。




** 17. 1. 20 国際共同第III相試験 (ONO-4538-44/CA209649 試験)

化学療法歴のないHER2陰性^{*20}の治癒切除不能な進行・再発の胃癌、食道胃接合部癌(腫瘍の中心が食道胃接合部より上下5cm以内に位置する腺癌)患者等^{*21}1,581例(日本人患者109例を含む)。化学療法併用(N+C併用)^{*22}群789例、化学療法群792例)を対象に、化学療法を対照としてN+C併用の有効性及び安全性を検討した。主要評価項目であるCPS≥5集団における無増悪生存期間及びCPS≥5集団における全生存期間について、N+C併用群は化学療法群に対し統計学的に有意な延長を示した。さらに、事前に規定された検定手順及び有意水準の割当てに従って検定が行われた結果、副次評価項目とされたCPS≥1集団及びITT集団における全生存期間についても、N+C併用群は化学療法群に対し統計学的に有意な延長を示した(2020年5月27日データカットオフ)。

	患者集団	投与群	例数	中央値[95%信頼区間](ヵ月)	ハザード比
PFS	CPS ≥5	N+C 併用群	473	7.69 [7.03~9.17]	0.68 [98%信頼区間: 0.56~0.81]
		化学療法群	482	6.05 [5.55~6.90]	
OS	CPS ≥5	N+C 併用群	473	14.39 [13.11~16.23]	0.71 [98.4%信頼区間: 0.59~0.86]
		化学療法群	482	11.10 [10.02~12.09]	
CPS ≥1	N+C 併用群	641	13.96 [12.55~14.98]	0.77 [99.3%信頼区間: 0.64~0.92]	
		化学療法群	655	11.33 [10.64~12.25]	
ITT	N+C 併用群	789	13.83 [12.55~14.55]	0.80 [99.3%信頼区間: 0.68~0.94]	
		化学療法群	792	11.56 [10.87~12.48]	



ITT集団における全生存期間



化学療法併用群 789 731 621 506 420 308 226 147 100 49 34 14 2 0
化学療法群 792 697 586 469 359 239 160 94 59 35 15 7 2 0

また、無増悪生存期間及び全生存期間について、PD-L1 発現率 (CPS) 別に探索的に解析を行った結果を以下に示す。

PD-L1 発現率	投与群	例数	無増悪生存期間の 中央値 [95% 信頼区間] (ヶ月)	ハザード比 [95% 信頼 区間]
CPS<1	N+C 併用群	140	8.67 [6.93~9.69]	0.93 [0.69~1.26]
	化学療法群	125	8.11 [6.87~9.82]	
1≤CPS<5	N+C 併用群	168	7.16 [6.83~8.38]	0.93 [0.73~1.20]
	化学療法群	173	8.15 [7.03~9.07]	
CPS≥5	N+C 併用群	473	7.69 [7.03~9.17]	0.69 [0.59~0.80]
	化学療法群	482	6.05 [5.55~6.90]	

PD-L1 発現率	投与群	例数	全生存期間の 中央値 [95% 信頼区間] (ヶ月)	ハザード比 [95% 信頼 区間]
CPS<1	N+C 併用群	140	13.08 [9.82~16.66]	0.92 [0.70~1.23]
	化学療法群	125	12.48 [10.12~13.83]	
1≤CPS<5	N+C 併用群	168	12.29 [9.63~14.26]	0.97 [0.76~1.24]
	化学療法群	173	11.99 [10.87~13.90]	
CPS≥5	N+C 併用群	473	14.39 [13.11~16.23]	0.70 [0.60~0.81]
	化学療法群	482	11.10 [10.02~12.09]	

*20 : HER2判定不能又は未測定の患者は組入れ可能とされた。


*21 : 食道に腫瘍の中心がある腺癌の患者も組み入れ可能とされた。

*22 : 本剤1回360mg及びオキサリプラチナ1回130mg/m² (体表面積) を3週間間隔で点滴静注し、カベシタビン1,000mg/m² (体表面積) を1日2回、2週間経口投与後に1週間休薬、又は本剤1回240mg、オキサリプラチナ1回85mg/m² (体表面積) 、ホリナートカルシウム1回400mg/m² (体表面積) 及びフルオロウラシル1回400mg/m² (体表面積) を2週間間隔で点滴静注し、フルオロウラシル2,400mg/m² (体表面積) を2日間かけて静脈内持続投与後に12日間休薬した。併用投与時においては、本剤を最初に投与し、化学療法は本剤の投与終了から30分以上の間隔をおいて投与を開始した。


安全性評価対象782例中738例(94.4%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、悪心323例(41.3%)、下痢253例(32.4%)、末梢性ニューロパチー221例(28.3%)、貧血203例(26.0%)、疲労202例(25.8%)、嘔吐195例(24.9%)、好中球減少症191例(24.4%)、好中球数減少158例(20.2%)、血小板減少症157例(20.1%)、食欲減退157例(20.1%)であった²⁸⁾。[7.10, 7.11参照]

** 17. 1. 21 国際共同第Ⅱ/Ⅲ相試験 (ONO-4538-37試験)

化学療法歴のないHER2陰性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌又は食道胃接合部癌(腫瘍の中心が食道胃接合部より上下5cm以内に位置する腺癌)患者724例(日本人患者395例を含む)。本剤と化学療法との併用(N+C併用)*23群362例、プラセボと化学療法との併用(P+C併用)群362例)を対象に、P+C併用を対照としてN+C併用の有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である無増悪生存期間(中央値[95%信頼区間])は、N+C併用群で10.45[8.44~14.75]ヶ月、P+C併用群で8.34[6.97~9.40]ヶ月であり、N+C併用群はP+C併用群に対し統計学的に有意な延長を示した(ハザード比0.68[98.51%信頼区間:0.51~0.90]、p=0.0007[層別log-rank検定]、2018年10月31日データカットオフ)。また、もう一つの主要評価項目である全生存期間(中央値[95%信頼区間])は、N+C併用群で17.45[15.67~20.83]ヶ月、P+C併用群で17.15[15.18~19.65]ヶ月であり、N+C併用群はP+C併用群に対し統計学的に有意な延長を示さなかった(ハザード比0.90[95%信頼区間:0.75~1.08]、p=0.257[層別log-rank検定]、2020年1月31日データカットオフ)。安全性評価対象359例中351例(97.8%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、末梢性感觉ニューロパチー201例(56.0%)、食欲減退187例(52.1%)、悪心181例(50.4%)、好中球数減少157例(43.7%)、血小板数減少144例(40.1%)、下痢125例(34.8%)、白血球数減少77例(21.4%)、嘔吐72例(20.1%)、疲労72例(20.1%)であった²⁹⁾。[7.11参照]



at risk数 無増悪生存期間(月)
本剤と化学療法との併用群 362 274 168 94 46 13 0
プラセボと化学療法との併用群 362 259 160 80 30 5 0



at risk数 生存期間(月)
本剤と化学療法との併用群 362 346 318 269 232 193 169 150 102 58 23 2 0
プラセボと化学療法との併用群 362 342 301 259 219 192 167 141 97 48 16 5 0

*23 : 本剤1回360mg及びオキサリプラチナ1回130mg/m² (体表面積) を3週間間隔で点滴静注し、テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤40mg/m² (体表面積) 又はカベシタビン1,000mg/m² (体表面積) を1日2回、2週間経口投与し、1週間休薬した。併用投与時においては、本剤を最初に投与し、オキサリプラチナは本剤の投与終了から30分以上の間隔をおいて投与を開始した。

〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉

17. 1. 22 国内第Ⅱ相試験 (ONO-4538-41試験)


プラチナ製剤とペメトレキセドナトリウム水和物との併用投与に不応又は不耐の進行又は転移性の悪性胸膜中皮腫患者(ECOG Performance Status 0及び1)34例を対象に、本剤240mgを2週間間隔で点滴静注した。主要評価項目である奏効率(Modified

RECIST criteria (2004)に基づく中央判定によるCR又はPR)は29.4% (95%信頼区間:16.8~46.2%)であった。なお、事前に設定した閾値は5.0%であった。また、安全性評価対象34例中23例(67.6%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、下痢4例(11.8%)、発疹4例(11.8%)、リバーゼ増加4例(11.8%)であった³⁰⁾。

	例数 (%)
完全奏効 (CR)	0 (0.0)
部分奏効 (PR)	10 (29.4)
安定 (SD)	13 (38.2)
進行 (PD)	9 (26.5)
評価不能	2 (5.9)

17.1.23 国際共同第Ⅲ相試験 (ONO-4538-48/CA209743 試験)

化学療法未治療の切除不能な悪性胸膜中皮腫患者605例(日本人患者60例を含む)。イピリムマブ(遺伝子組換え)併用(N+I併用)*24群303例、化学療法群302例)を対象に、ペメトレキセドナトリウム水和物及びプラチナ製剤(シスプラチン又はカルボプラチナ)併用療法を対照として、N+I併用群の有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である全生存期間(中央値[95%信頼区間])は、N+I併用群で18.07[16.82~21.45]ヶ月、化学療法群で14.09[12.45~16.23]ヶ月であり、N+I併用投与は化学療法に対し統計学的に有意な延長を示した(ハザード比0.74[96.6%信頼区間:0.60~0.91]、p=0.002[層別log-rank検定]、2020年3月25日データカットオフ)。また、安全性評価対象300例中240例(80.0%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、下痢62例(20.7%)、そう痒症49例(16.3%)、発疹43例(14.3%)、疲労41例(13.7%)、甲状腺機能低下症32例(10.7%)、悪心30例(10.0%)であった³¹⁾。



*24: 本剤1回3mg/kg(体重)を2週間間隔、イピリムマブ(遺伝子組換え)1回1mg/kg(体重)を6週間間隔で点滴静注^{注5)}した。併用投与時においては、本剤を最初に投与し、イピリムマブ(遺伝子組換え)は本剤の投与終了から30分以上の間隔をおいて投与を開始した。

(がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌)

17.1.24 海外第Ⅱ相試験 (CA209142 試験)

①フッ化ビリミジン系抗悪性腫瘍剤及び②オキサリプラチナ又はイリノテカン塩酸塩水和物を含む化学療法歴のある治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)又はミスマッチ修復欠損(dMMR)を有する結腸・直腸癌患者74例を対象に、本剤3mg/kgを2週間間隔で点滴静注^{注1)}した。主要評価項目である奏効率(RECISTガイドライン1.1版に基づく治験責任医師判定によるCR又はPR)の結果は、31.1% (95%信頼区間:20.8~42.9%、2016年8月10日データカットオフ)であった。また、安全性評価対象74例中51例(68.9%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、疲労17例(23.0%)、下痢16例(21.6%)、そう痒症10例(13.5%)、リバーゼ増加9例(12.2%)、発疹8例(10.8%)であった³²⁾。

	例数 (%)
完全奏効 (CR)	0 (0.0)
部分奏効 (PR)	23 (31.1)
安定 (SD)	29 (39.2)
進行 (PD)	18 (24.3)
評価不能	4 (5.4)

①フッ化ビリミジン系抗悪性腫瘍剤及び②オキサリプラチナ又はイリノテカン塩酸塩水和物を含む化学療法歴のある治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)又はミスマッチ修復欠損(dMMR)を有する結腸・直腸癌患者119例を対象に、本剤とイピリムマブ(遺伝子組換え)を併用投与した*25)。主要評価項目である奏効率(RECISTガイドライン1.1版に基づく治験責任医師判定によるCR又はPR)の結果は、54.6% (95%信頼区間:45.2~63.8%、2017年7月6日データカットオフ)であった。また、安全性評価対象119例中87例(73.1%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、下痢26例(21.8%)、疲労21例(17.6%)、そう痒症20例(16.8%)、発熱18例(15.1%)、AST増加17例(14.3%)、甲状腺機能低下症16例(13.4%)、悪心15例(12.6%)、ALT増加14例(11.8%)、甲状腺機能亢進症13例(10.9%)、発疹13例(10.9%)であった³³⁾。[5.15参照]


	例数 (%)
完全奏効 (CR)	4 (3.4)
部分奏効 (PR)	61 (51.3)
安定 (SD)	37 (31.1)
進行 (PD)	14 (11.8)
評価不能	3 (2.5)

*25: 本剤1回3mg/kg(体重)とイピリムマブ(遺伝子組換え)1回1mg/kg(体重)を同日に3週間間隔で4回点滴静注した後、本剤1回3mg/kg(体重)を2週間間隔で点滴静注^{注4)}した。併用投与時においては、本剤を最初に投与し、イピリムマブ(遺伝子組換え)は本剤の投与終了から30分以上の間隔をおいて投与を開始した。

〈がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌〉

17.1.25 国際共同第Ⅲ相試験 (ONO-4538-24/BMS CA209473 試験)

フッ化ビリミジン系抗悪性腫瘍剤及びプラチナ製剤を含む併用療法に不応又は不耐の食道癌患者*26)388例(日本人患者274例を含む)。本剤群193例、対照群195例)を対象に、タキサン系薬剤(ドセタキセル又はパクリタキセル)を対照として本剤240mgを2週間間隔で点滴静注したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である全生存期間(中央値[95%信頼区間])は、本剤群で11.17[9.99~13.73]ヶ月、対照群で8.54[7.20~9.89]ヶ月であり、本剤はタキサン系薬剤に対し統計学的に有意な延長を示した(ハザード比0.79[95%信頼区間:0.63~0.99]、p=0.0381[層別log-rank検定]、2018年11月12日データカットオフ)。また、安全性評価対象192例中129例(67.2%)に副作用(臨床検査値異常を含む)が認められた。主な副作用は、発疹23例(12.0%)、下痢20例(10.4%)、甲状腺機能低下症17例(8.9%)、そう痒症17例(8.9%)、食欲減退15例(7.8%)、発熱15例(7.8%)、疲労14例(7.3%)であった³⁴⁾。[5.18参照]




*26: 大動脈、気管等への明らかな浸潤を認めず、かつ食道又は気管にステント治療法を実施していない患者が対象とされた。

**〈食道癌における術後補助療法〉

**17.1.26 国際共同第Ⅲ相試験 (ONO-4538-43/CA209577 試験)

術前化学放射線療法により病理学的完全奏効(pCR)が認められなかった*27)食道癌又は食道胃接合部癌(腫瘍の中心が食道胃接合部より上下5cm以内に位置する腺癌又は扁平上皮癌)の術後患者794例(日本人患者63例を含む)。本剤群532例、プラセボ群262例)を対象に、プラセボを対照として本剤240mgを2週間間隔で8回点滴静注した後、480mgを4週間間隔で点滴静注^{注7)}(最長12ヶ月間)したときの有効性及び安全性を検討した。主要評価項目である無病生存期間(中央値[95%信頼区間])は、本剤群で22.41[16.62~

34.00] カ月、プラセボ群で 11.04 [8.34~14.32] カ月であり、本剤はプラセボに対し統計学的に有意な延長を示した（ハザード比 0.69 [96.4 % 信頼区間: 0.56~0.86]、p = 0.0003 [層別 log-rank 検定]、2020 年 5 月 12 日データカットオフ）。また、安全性評価対象 532 例中 376 例 (70.7%) に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、疲労 90 例 (16.9%)、下痢 88 例 (16.5%)、そう痒症 53 例 (10.0%) であった³⁵⁾。[5.21 参照]



*27：術後の病理組織学的検査で American Joint Committee on Cancer (AJCC) 病期分類（第7版）に基づく ypT1 以上又は ypN1 以上であることと定義された。

注1) 本剤の承認された単独投与の用法及び用量は「通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。」である。

注2) 本剤の承認された根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合の用法及び用量は「通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 80mg を 3 週間間隔で 4 回点滴静注する。その後、ニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。」である。

注3) 本剤の承認された切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対して他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合の用法及び用量は「通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 360mg を 3 週間間隔で点滴静注する。」である。

注4) 本剤の承認された化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性 (MSI-High) を有する結腸・直腸癌に対してイピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合の用法及び用量は「通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 240mg を 3 週間間隔で 4 回点滴静注する。その後、ニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。」である。

注5) 本剤の承認された切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫に対してイピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合の用法及び用量は「通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 360mg を 3 週間間隔で点滴静注する。」である。

*注6) 本剤の承認された再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫の用法及び用量は「通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。」

通常、小児にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 3mg/kg (体重) を 2 週間間隔で点滴静注する。なお、体重 40kg 以上の小児には、ニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注することもできる。」である。

**注7) 本剤の承認された食道癌における術後補助療法の用法及び用量は「通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回 240mg を 2 週間間隔又は 1 回 480mg を 4 週間間隔で点滴静注する。ただし、食道癌における術後補助療法の場合は、投与期間は 12 カ月間までとする。」である。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

ニボルマブは、ヒト PD-1 に対する抗体であり、PD-1 とそのリガンドである PD-L1 及び PD-L2 との結合を阻害し、がん抗原特異的な T 細胞の増殖、活性化及び細胞傷害活性の増強等により、腫瘍増殖を抑制すると考えられる³⁶⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：ニボルマブ（遺伝子組換え）

Nivolumab (Genetical Recombination)

分子量：約 145,000

本質：ヒト PD-1 に対する遺伝子組換えヒト IgG4 モノクローナル抗体であり、重鎖 221 番目のアミノ酸残基が Pro に置換されている。チャイニーズハムスター卵巣細胞により產生される 440 個のアミノ酸残基からなる重鎖 2 本及び 214 個のアミノ酸残基からなる軽鎖 2 本で構成される糖タンパク質である。

20. 取扱い上の注意

外箱開封後は遮光して保存すること。

21. 承認条件

21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

**
再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫

21.2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することにより、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

22. 包装

〈オプジー ボ点滴静注 20mg〉

2mL [1 バイアル]

〈オプジー ボ点滴静注 100mg〉

10mL [1 バイアル]

〈オプジー ボ点滴静注 120mg〉

12mL [1 バイアル]

〈オプジー ボ点滴静注 240mg〉

24mL [1 バイアル]

23. 主要文献

- 1) オプジー ボ点滴静注 適正使用ガイド (単剤療法版・併用療法版)
- 2) 小野薬品工業：海外第 I 相 (CA209039) 試験成績 (社内資料)
- 3) 小野薬品工業：海外第 II 相 (CA209205) 試験成績 (社内資料)
- 4) Yamamoto N. et al. : Invest. New Drugs, 2017 ; 35 : 207-216 (ONO-4538-01 試験)
- 5) 小野薬品工業：国内第 II 相 (ONO-4538-02) 試験成績 (社内資料；2014 年 7 月 4 日承認、CTD 2.7.6.4)
- 6) 小野薬品工業：国内第 II 相 (ONO-4538-08) 試験成績 (社内資料)
- 7) Robert C. et al. : N. Engl. J. Med., 2015 ; 372 : 320-330 (CA209066 試験)
- 8) Weber J. S. et al. : Lancet Oncol., 2015 ; 16 : 375-384 (CA209037 試験)
- 9) 小野薬品工業：海外第 III 相 (CA209037) 試験成績 (社内資料)
- 10) 小野薬品工業：国内第 II 相 (ONO-4538-17) 試験成績 (社内資料)
- 11) 小野薬品工業：海外第 III 相 (CA209067) 試験成績 (社内資料)
- 12) Weber J. et al. : N. Engl. J. Med., 2017 ; 377 : 1824-1835 (ONO-4538-21/CA209238 試験)
- 13) 小野薬品工業：国内第 II 相 (ONO-4538-05) 試験成績 (社内資料；2015 年 12 月 17 日承認、CTD 2.7.6.7)
- 14) Brahmer J. et al. : N. Engl. J. Med., 2015 ; 373 : 123-135 (CA209017 試験)
- 15) 小野薬品工業：国内第 II 相 (ONO-4538-06) 試験成績 (社内資料；2015 年 12 月 17 日承認、CTD 2.7.6.8)
- 16) Borghaei H. et al. : N. Engl. J. Med., 2015 ; 373 : 1627-1639 (CA209057 試験)
- 17) 小野薬品工業：国際共同第 III 相 (ONO-4538-52) 試験成績 (社内資料)
- 18) 小野薬品工業：国際共同第 III 相 (ONO-4538-27/CA209227) 試験成績 (社内資料)
- 19) 小野薬品工業：国際共同第 III 相 (ONO-4538-77/CA2099LA) 試験成績 (社内資料)
- 20) Motzer R. J. et al. : N. Engl. J. Med., 2015 ; 373 : 1803-1813 (ONO-4538-03/CA209025 試験)
- 21) Motzer R. J. et al. : N. Engl. J. Med., 2018 ; 378 : 1277-1290 (ONO-4538-16/CA209214 試験)
- 22) 小野薬品工業：国際共同第 III 相 (ONO-4538-81/CA2099ER) 試験成績 (社内資料)
- 23) 小野薬品工業：国内第 II 相 (ONO-4538-15) 試験成績 (社内資料；2016 年 12 月 2 日承認、CTD 2.7.6.4)
- 24) Younes A. et al. : Lancet Oncol., 2016 ; 17 : 1283-1294 (CA209205 試験)

- *25) 小野薬品工業：国内第Ⅰ相 (NCCH1606) 試験成績 (社内資料；
2021年9月27日承認、CTD 2.7.6.1)
- 26) Ferris R. L. et al. : N. Engl. J. Med. 2016 ; 375 : 1856-1867
(ONO-4538-11/CA209141 試験)
- 27) Kang Y-K. et al. : Lancet, 2017 ; 390 : 2461-2471 (ONO-4538-12 試験)
- **28) 小野薬品工業：国際共同第Ⅲ相 (ONO-4538-44/CA209649) 試験
成績 (社内資料)
- **29) 小野薬品工業：国際共同第Ⅱ/Ⅲ相 (ONO-4538-37) 試験成績 (社
内資料)
- 30) 小野薬品工業：国内第Ⅱ相 (ONO-4538-41) 試験成績 (社内資料；
2018年8月21日承認、CTD 2.7.6.1)
- 31) 小野薬品工業：国際共同第Ⅲ相 (ONO-4538-48/CA209743) 試験
成績 (社内資料)
- 32) 小野薬品工業：海外第Ⅱ相 (CA209142) 試験成績 (社内資料)
- 33) Overman M. J. et al. : J. Clin. Oncol., 2018 ; 36 : 773-779
(CA209142 試験)
- 34) 小野薬品工業：国際共同第Ⅲ相 (ONO-4538-24/BMS CA209473)
試験成績 (社内資料)
- **35) 小野薬品工業：国際共同第Ⅲ相 (ONO-4538-43/CA209577) 試験
成績 (社内資料)
- 36) Wang C. et al. : Cancer Immunol. Res., 2014 ; 2 : 846-856

24. 文献請求先及び問い合わせ先

小野薬品工業株式会社 くすり相談室
〒541-8564 大阪市中央区久太郎町1丁目8番2号
電話 0120-626-190

プリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 メディカル情報グループ
(住所) 東京都新宿区西新宿6-5-1
(TEL) 0120-093-507

26. 製造販売業者等

26. 1 製造販売

ono 小野薬品工業株式会社
大阪市中央区久太郎町1丁目8番2号

26. 2 プロモーション提携

ブルーストア・マイヤーズ スクイブ株式会社
東京都新宿区西新宿6-5-1